

↓ Start ↓

2
か
月

ヒブ①
肺炎球菌①
B型肝炎①
ロタリックス①

□の中は同時接種可能!

4週間

3
か
月

ヒブ②
肺炎球菌②
B型肝炎②
ロタリックス②(生後24週までに) ←ロタリックス 完了!

4種混合① New!

4週間

4
か
月

ヒブ③
肺炎球菌③

4種混合②

(※1、2)

4週間

5
|
8
か
月

BCG (保健センターで集団接種)
注)BCG接種予定日に4種混合③が打てていなかった場合、
BCG接種から4週間あけて接種可能

4種混合③

(※3)

最低1週間

5
|
9
か
月

B型肝炎③ ←B型肝炎 完了!

B型肝炎②から4-5か月後



もしもしキッズクリニック 推奨予防接種スケジュール

1歳頃まで

1
歳

MR (麻疹風疹混合) ① New!
水痘 (水ぼうそう) ① New!
流行性耳下腺炎 (おたふく) ① New!

4週間

ヒブ 追加 (※1)1歳以上かつ③から最低7か月 ←ヒブ 完了
肺炎球菌 追加 (※2)1歳~1歳3か月 ←肺炎球菌 完了

最低1週間

4種混合 追加 ←4種混合 完了!
(※3)4種混合③から1年~1年半後

水痘①から6か月後

水痘② ←水痘 完了!

次のワクチンが接種可能になるまでの間隔

- ・ 生ワクチン : 4週間後の同じ曜日から接種可能
- ・ 不活化ワクチン : 1週間後の同じ曜日から接種可能

3歳以降



もしもしキッズクリニック 推奨予防接種スケジュール

3歳
日本脳炎① ^{New!} (6か月から接種は可能)
↓ 4週間 ↓
日本脳炎②

↓ 1年 ↓
4歳
日本脳炎・追加
(日本脳炎②から1年後)

↓
5 | 6歳
MR (麻疹風疹混合) ② ←MR 完了!
流行性耳下腺炎 (おたふく) ② ←おたふく 完了!
(5歳以上7歳未満で小学校入学前の1年間)
★3種混合 (5歳以上7歳未満)
★不活化ポリオ (5歳以上7歳未満)

★3種混合とポリオの追加接種が2018～推奨されています。
(時期は就学前の1年間。任意接種となります。)
4種混合は4回までしか打てない為、この2本の組み合わせとなります。

↓
9 | 12歳
9歳～12歳
日本脳炎・Ⅱ期 ←日本脳炎 完了!

11歳～12歳 (13歳未満)
2種混合 (DT)

次のワクチンが接種可能になるまでの間隔

- ・生ワクチン：4週間後の同じ曜日から接種可能
- ・不活化ワクチン：1週間後の同じ曜日から接種可能

<定期接種>

- ・ヒブ ・肺炎球菌 ・B型肝炎 ・4種混合
- ・2種混合 ・日本脳炎
- ・BCG ・MR (麻疹風疹) ・水痘

<任意接種(自費)>

- ・ロタウイルス ・流行性耳下腺炎 (おたふく)
- ・インフルエンザ
- ・B型肝炎 (※1歳以上) ・水痘 (※3歳以上)
- ★3種混合、ポリオ (5-6歳 就学前の追加) ←new

【★ヒブ・肺炎球菌で初回接種が遅れた時の接種】

<ヒブワクチン>

- ・7-11か月で初回接種:3回のみ接種
① 1か月 → ② 7か月以上 → ③
- ・1-4歳で初回接種:1回のみ接種

<肺炎球菌>

- ・7-11か月で初回接種:3回のみ接種
① 1か月 → ② 60日以上あけて1歳以降 → ③
- ・1歳-23か月で初回接種:2回のみ接種
① 60日以上 → ②
- ・2-4歳で初回接種:1回のみ